

Monitoraggio Fase 2


Report settimanale n.56

Settimana di riferimento: 31/05/2021-06/06/2021


Regione Liguria

Update 11.06.2021

Incidenza/10.000ab. di casi positivi, per data di comunicazione




Incidenza casi giornalieri/10.000ab. Italia vs Regione Liguria




“green if the 14-day notification rate is lower than 25 cases per 100 000 and the test positivity rate below 4%”

	Incidenza in 14 gg	Proporzione test positivi
Report 55 e 56	33/100.000	1,9% e 1,2%
Oggi	25,6/100.000	1%

Combined indicator: 14-day notification rate, testing rate and test positivity, updated 10 June 2021



Incidenza/10.000ab. di casi positivi per provincia, per data di comunicazione




	Inc. cumulativa /100.000 ab., ultimi 7 giorni
Savona	13
Spezia	8
Imperia	0
Genova	10
Liguria*	10

*considerati anche i residenti extra-regione o con residenza sconosciuta

*Rimossi nella settimana 3-9 aprile 14 tamponi POS comunicati tardivamente da ASL5

“Copyright © 2020– A.Li.Sa. – vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.

3.2 R_t calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS



$R(t)$ Sintomi: 0,64 (CI: 0,56-0,72)
Scenario 1

Sintesi del Report n.54

Indicatori	Liguria
Processo sulla capacita' di monitoraggio (Ind. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)	OK , superiori al 95% (soglia 60%)
Processo sulla capacita' di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti (Ind. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)	OK , superiori alla soglia
Di trasmissione (Ind. 3.1, 3.4, 3.5)	In diminuzione
R(t)	Sintomi: 0.64 (CI: 0.56-0.72) Medio: 0.67 (CI: 0.54-0.79)
Di pressione sul sistema sanitario Tasso di occupazione dei posti letto di Terapia Intensiva Tasso di occupazione di dei posti letto di Area Medica	10% (soglia 30%) 4% (soglia 40%)

Valutazione complessiva del rischio [fonte: MinSal, ISS, Cabina di Regia]

Matrice di attribuzione del rischio in base agli algoritmi di valutazione di probabilità ed impatto

Probabilità \ Impatto	Molto Bassa	Bassa	Moderata	Alta
Molto Basso	Rischio Molto basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Moderato
Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Moderato	Rischio Moderato
Moderato	Rischio Basso	Rischio Moderato	Rischio Moderato	Rischio Alto
Alto	Rischio Moderato	Rischio Moderato	Rischio Alto	Rischio Molto Alto



Valutazione complessiva del rischio: Basso
Scenario: 1 - R(t) (CI 95% inf. 0,56)

AREA BIANCA dal 7 giugno

Indicatori Decisionali (D.L. 18 maggio 2021, n.65)


*Tre settimane consecutive
 ** uno dei due
 ***entrambi presenti

Area di Rischio	Incidenza (/100.000*sett.)	PPLL occupati Area Medica	PPLL occupati UTI	Tamponi Min. (/100.000*die)	Valutazione del Rischio (D.M. 30 aprile 2020)
Rossa	>250			500 (7550 in Liguria)	\
	150-249	>40%***	>30%***	250 (3780 in Liguria)	\
Arancione	150-249	30-40%	20-30%	250 (3780 in Liguria)	\
	DATI DA AREA GIALLA				Alto
Gialla	150-249	<30%**	<20%**	250 (3780 in Liguria)	\
	50-149			150 (2270 in Liguria)	\
Bianca X	<50*			100 (1510 in Liguria)	\

Report 56	11,9	4%	10%	4.386	Basso
------------------	-------------	-----------	------------	--------------	--------------

Popolazione target, aderenti e vaccinati

Proporzione (%) di vaccinati su coloro che hanno manifestato volontà alla vaccinazione						
98,7%	100,0%	87,7%	98,0%	96,3%	95,1%	74,3%
Proporzione (%) di coloro che hanno manifestato la volontà alla vaccinazione						
	100,0%	97,4%	93,8%	79,2%	74,8%	70,7%



Fonti: AVC e sistema di prenotazione CUP aggiornati
rispettivamente al 09.06.21 e 10.06.21

“Copyright © 2020– A.Li.Sa. – vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.

Raccomandazioni vaccino AZ

[Circolare 4 giugno 2021](#) - Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni. Aggiornamento note informative «*Il vaccino Vaxzevria (precedentemente noto come Vaccino COVID-19 AstraZeneca) è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Vaxzevria viene somministrato agli adulti di età pari o superiore a 18 anni.*»

[Circolare 5 maggio 2021](#) - Trasmissione parere del CTS in merito alla estensione dell'intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria: «il CTS ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili sull'insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi splancniche, trombosi arteriose) associate a piastrinopenia, riportate essersi verificate solamente dopo la prima dose del vaccino di AstraZeneca, i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di questo vaccino senza sviluppare questa tipologia di eventi, non presentano controindicazione per una seconda somministrazione del medesimo tipo di vaccino»

[Circolare 14 aprile 2021](#) - Vaccino Vaxzevria (AstraZeneca). Aggiornamento nota informativa del consenso

[Circolare 7 aprile 2021](#) - Vaccino Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca). Aggiornamento raccomandazioni «Facendo seguito alla nota circolare prot. N° 8811-08/03/2021-DGPRES e alla nota circolare prot. N° 11156-19/03/2021-DGPRES, visto il parere della CTS di AIFA (allegato1) acquisito con prot. N° 14357-07/04/2021-DGPRES, sentito il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ribadendo che il vaccino Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età, sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da COVID-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni»

[Circolare 28 marzo 2021](#) - Modulo consenso campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Aggiornamento

[Circolare 25 marzo 2021](#) - Aggiornamento modulo consenso e strumenti operativi campagna vaccinale

[Circolare 19 marzo 2021](#) - Trasmissione nota AIFA sul parere di sospensione e revoca del divieto d'uso del vaccino Covid-19 AstraZeneca: «le vaccinazioni con il vaccino COVID-19 AstraZeneca possono essere riprese con l'esclusione dei lotti al momento posti sotto sequestro»

Raccomandazioni vaccino AZ

[Circolare 8 marzo 2021](#) - Utilizzo del vaccino Covid-19 Vaccine AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni «...Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni. Tale indicazione non è da intendersi applicabile ai soggetti identificati come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19»

[Circolare 3 marzo 2021](#) - Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2

[Circolare 22 febbraio 2021](#) - Aggiornamento sulle modalità d'uso del vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca e delle raccomandazioni *ad interim* sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 «...offerta fino a 65 anni, compresi ... i vulnerabili»

[Circolare 9 febbraio 2021](#) - Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato «è indicato per l'immunizzazione attiva a partire dai 18 anni di età ... fino a 55 anni in assenza di patologie che aumentino il rischio ...»

[Circolare 14 gennaio 2021](#) - Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la FASE 1 e aggiornamento del consenso informato

[Decreto-legge 5 gennaio 2021](#) - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 5 - [consenso informato ospiti Rsa e altre strutture](#))

[Circolare 24 dicembre 2020](#) - Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione